

Неделя профилактики **инфекций,** **передающихся половым путём**

С 13 ПО 19 ИЮЛЯ



ПАПИЛЛОМАВИРУС

СИФИЛИС

КАНДИДОЗ



ЗППП

ЗАБОЛЕВАНИЯ, ПЕРЕДАЮЩИЕСЯ
ПОЛОВЫМ ПУТЕМ



ГЕРПЕС

ГОНОРЕЯ



ХЛАМИДИОЗ

ТРИХОМОНИАЗ

Наиболее частые СИМПТОМЫ ИППП:

- Нестандартные вагинальные выделения
- Выделения из мочеиспускательного канала
- Чувство жжения при мочеиспускании
- Генитальные язвы
- Боли в области живота



ЕСЛИ ВЫ ПРОШЛИ ЛЕЧЕНИЕ ОТ ИППП:

обязательно сдайте

КОНТРОЛЬНЫЕ АНАЛИЗЫ —

только они покажут, что инфекция побеждена.

На время лечения

**ПОЛНОСТЬЮ ИСКЛЮЧИТЕ
ПОЛОВЫЕ КОНТАКТЫ**

*(даже с постоянным
партнёром). Иначе
вы либо заразите другого,
либо подхватите инфекцию
снова.*



И помните: при любых подозрительных симптомах (выделения, зуд, язвочки) — сразу к врачу. Самолечение только ухудшит ситуацию.

СИМПТОМЫ

ОСЛОЖНЕНИЯ



Что такое генитальный герпес?

Это хроническое рецидивирующее вирусное заболевание, передаваемое преимущественно половым путем.

Вызывается вирусом простого герпеса (ВПГ) как I, так и II типа

Вирус сохраняется пожизненно в нервных клетках ганглиев центральной нервной системы. Под воздействием неблагоприятных факторов (стрессов, ультрафиолетового или радиоактивного облучения, иммунодефицитных состояний и др.) происходит активация вируса и появляются клинические симптомы заболевания.

Ежегодно генитальным герпесом заболевают около 500 000 человек. У большинства из них инфекция остается не диагностированной вследствие скрытого течения.

ИНФЕКЦИИ, ПЕРЕДАЮЩИЕСЯ ПОЛОВЫМ ПУТЁМ (ИППП) -

это инфекции, передающиеся от человека к человеку через сексуальный контакт, через инфицированную кровь. Некоторые инфекции могут передаваться от матери к ребенку во время беременности или родов.



ИППП могут вызываться более чем 30 возбудителями. Наиболее частые: сифилис, гонорея, хламидиоз, трихомониаз, ВИЧ, гепатит В, герпес и вирус папилломы человека.

СИФИЛИС

Факторы риска


- Незащищенный секс
- Множественные половые контакты
- ВИЧ

Сифилис - это инфекционное заболевание, передаваемое по большей части половым путем. Начинается, как правило, с появления безболезненной язвы на половых органах, анусе или во рту




Возбудитель сифилиса *Treponema pallidum*

1-я стадия




3-90 дней после заражения

2-я стадия



4-10 недель после заражения

3-я стадия



3-15 лет после заражения

ИППП опасны для здоровья будущих детей

Вмешиваясь в процесс формирования и развития плода, возбудители ИППП вызывают различные **врожденные уродства**, иногда **несовместимые с жизнью**. В некоторых случаях аномалии развития проявляются через несколько лет после рождения ребенка в виде **дисфункции сердца, печени, почек и умственных способностей**.



Профилактика заболеваний, передающихся половым путем



ПРЕДОХРАНЯЙТЕСЬ!



БУДЬТЕ ПОСТОЯННЫ



ОСТОРОЖНЕЕ ЮНЫМ



НЕТ СЕКС-ТУРИЗМУ



НИКАКОГО АЛКОГОЛЯ

